

Τοποθεσίες Κέντρου Σύλλεξης SEALS [SEALS Collection Centre Locations]:

Νοσοκομείο Prince of Wales: Κτήριο Cobden Parkes, Όροφος 2 East, High Street, Randwick. Τηλ. 93829060
Ιδιωτικό Νοσοκομείο Prince of Wales: Γραφείο 28, Όροφος 7, Barker Street, Randwick. Τηλ. 96504963
Νοσοκομείο St George: Ισόγειο, Κτήριο Κλινικών Υπηρεσιών, Gray Street, Kogarah. Τηλ. 91133027
Νοσοκομείο Sutherland: Κτήριο Παθολογίας, Γωνία Kareenna Road και Kingsway, Caringbah. Τηλ. 95407420
Νοσοκομείο Wollongong: 7^{ος} Όροφος, Block C, Νοσοκομείο Wollongong, Crown Street, Wollongong Τηλ. 42534009
Νοσοκομείο Shellharbour: Νοσοκομείο Shellharbour, Madigan Blvd, Shellharbour. Τηλ. 42952487
Νοσοκομείο Shoalhaven: Νοσοκομείο Shoalhaven, Shoalhaven Street, Nowra Τηλ. 44239235

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ [PATIENT INFORMATION SHEET]

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ [CARE OF YOUR PUNCTURE SITE FOLLOWING BLOOD COLLECTION]

Μερικά άτομα με συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις μετά από εξέταση αίματος ίσως έχουν παρατεταμένη αιμορραγία που μπορεί να προκαλέσει μώλωπα (μελάνιασμα).

Τα αντιφλεγμονώδη και αιματο-αραιωτικά φάρμακα μπορεί να δημιουργήσουν παρατεταμένη αιμορραγία.

Άτομα που αντιμετωπίζουν τις παραπάνω καταστάσεις θα χρειάζεται να εφαρμόζουν πίεση ακριβώς πάνω στο σημείο περισσότερο χρονικό διάστημα.

ΤΟ ΜΕΛΑΝΙΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:

- 1. ΜΗΝ ΦΟΡΑΤΕ ΣΦΙΚΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ**
- 2. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ π.χ. σακούλες από ψώνια**
- 3. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ**

Το προσωπικό μας θα βεβαιώσει ότι έχει σταματήσει η αιμορραγία πριν φύγετε από το τμήμα μας.

Όμως αν παρουσιάσετε πρήξιμο ή πόνο, σηκώστε το άκρο, τοποθετήστε μια σακούλα με πάγο στο σημείο τρυπήματος και ζητείστε ιατρική βοήθεια.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟ SEALS