

مواقع مراكز سحب الدم SEALS: (SEALS Collection Centre Locations)

- مستشفى Prince of Wales: مبنى Cobden Parkes، الطابق الثاني شرقي، High Street Randwick، هاتف 93829060
مستشفى Prince of Wales الخاص: Suite 28 الطابق السابع، Barker Street Randwick، هاتف 96504963
مستشفى St George: الطابق الأرضي، خدمات العيادات (Clinical Services)، Gray Street Kogarah، هاتف 91133027
مستشفى Sutherland: مبنى المختبرات، تقاطع Kareenna Road و Kingsway، Caringbah، هاتف 95407420
مستشفى Wollongong: الطابق السابع، المبنى C، مستشفى Wollongong، Crown Street Wollongong، هاتف 42534009
مستشفى Shellharbour: مستشفى Shellharbour، Madigan Blvd Shellharbour، هاتف 42952487
مستشفى Shoalhaven: مستشفى Shoalhaven، Shoalhaven Street Nowra، هاتف 44239235

ورقة معلومات للمرضى (PATIENT INFORMATION SHEET)

العناية بمكان إدخال الإبرة
بعد سحب الدم

(CARE OF YOUR PUNCTURE SITE FOLLOWING BLOOD COLLECTION)

بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة قد يعانون من النزيف لفترة طويلة مما قد يسبب الإزرقاق بعد سحب الدم. الأدوية المضادة للالتهاب والأدوية المسيلة للدم تسبب النزيف لوقت طويل. وذلك يتطلب من الأشخاص الذين يعانون من الحالات المذكورة أعلاه الضغط على مكان الإبرة مباشرة لمدة أطول.

يمكن تجنب الإزرقاق من خلال اتباع التعليمات التالية:

1. عدم ارتداء الملابس الضيقة فوق مكان إدخال الإبرة أو حوله.
 2. تجنب رفع الأشياء الثقيلة أو حملها، كأكياس التسوق.
 3. تجنب القيام بأعمال شاقة باستخدام الطرف لمدة ساعتين على الأقل بعد سحب الدم.
- سيؤكد العاملون لدينا من توقف النزيف عندك قبل مغادرتك القسم. وإذا عانيت من التورم أو الألم، قم برفع الطرف إلى الأعلى وضع كيساً من الثلج على المكان واطلب مشورة طبيب.

شكراً لاستخدامكم SEALS